

Jultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 35 du 18 novembre 2008 - 2 pages

Actualité

COLZA: stade rosette

CEREALES: levée à début tallage.

Colza

Ravageurs

Depuis la fin octobre, les captures de grosses altises et de charançon du bourgeon terminal sont insignifiantes. Des pucerons cendrés persistent dans certaines situations du sud de la région comme à Monnerville, Guigneville/Essonne (91), Château Landon (77), avec crispation des feuilles du coeur de la rosette. Il conviendra de suivre attentivement ce printemps, le développement de ces pucerons cendrés.

Une notation **mouche du chou** a été réalisée dans les parcelles du réseau d'observation SRPV -Fredon-Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile de France. Le niveau moyen de 15% de pieds touchés (avec des galeries creusées à la surface du pivot), se situe dans la fourchette habituelle (15% à 25%) depuis le grand retour de ce ravageur en 2003. Les situations les plus attaquées se situent comme les années précédentes sur la frange sud de Seine et Marne, dans le Vexin et le centre des Yvelines, mais aussi cette fois dans le nord Seine et Marne (voir carte). L'Essonne est un peu moins concernée par ce ravageur, mais par contre, on y trouve plusieurs parcelles attaquées par les taupins.





MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt Service Régional de la Protection des Végétaux ILE DE FRANCE

10 rue du séminaire 94516 RUNGIS cedex Tél: 01-41-73-48-00 Fax: 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON lle de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis Directeur gérant : N. THERRE

Publication périodique C.P.P.A.P n°0909 B 07113 ISSN n°0767-5542

Tarifs individuels 2008 87 euros (papier) 76 euros (fax) 68 euros (mail)





P206

Maladies

L'oïdium reste encore bien implanté, surtout dans le sud Seine et Marne. On note la présence d'alternaria. Les symptômes de phoma progressent avec la répétition des épisodes pluvieux. Le risque est minimisé par les tolérances variétales actuelles (TPS majoritaires) et le développement tardif, suite au mois de septembre faiblement arrosé. Le seuil de 10% de plantes en moyenne dans le réseau porteuses de taches a été atteint le plus tard des 6 dernières campagnes (voir tableau).

Date franchissement seuil 10% plantes porteuses de phoma

automne	2002	2003	2004	2005	2007	2008
semaine	45	45	45	40	42	46

Céréales

Les captures de cicadelles sont insignifiantes depuis le début du mois de novembre. Les conditions climatiques restent peu favorables à un séjour prolongé des pucerons. La présence de mouche des semis est observée dans certaines parcelles (pieds qui jaunissent et dernière feuille s'arrachant facilement avec sa base rongée).

On observe des symptômes d'oïdium parfois.